

Задачі для підготовки до складання іспиту КРОК2

15. 17. 0. 0. Фізіологічні пологи*

Примітка:

** - тестові завдання, що підготовлені співробітниками кафедри (тут і надалі)*

1*

При проведенні внутрішнього дослідження у роділлі встановлено: шийка матки згладжена, розкриття 8 см, плодовий міхур відсутній. Стрілоподібний шов в лівому косому розмірі, мале тім'ячко зліва ближче до крижів. Нижній полюс голівки сягає площини широкої частини порожнини малого тазу. Вкажіть позицію та вид позиції плода.

- A** Перша позиція, задній вид.
- B** Перша позиція, передній вид.
- C** Друга позиція, передній вид.
- D** Друга позиція, задній вид.
- E** Високе пряме стояння стрілоподібного шва.

*Перша позиція, задній вид.

2*

Роділля, 25 років, II період пологів. При внутрішньому акушерському дослідженні розкриття шийки матки повне. Плідний міхур відсутній. Передлежить голівка, яка повністю **виповнює крижову впадину**. Сідничні ості **не визначаються**. При потугах промежина **вип'ячується**. Де знаходиться голівка плоду?

- A** В площині виходу малого тазу
- B** Малим сегментом у площині входу в малий таз
- C** Великим сегментом у площині входу в малий таз
- D** В площині широкої частини малого тазу
- E** В площині вузької частини малого тазу

*В площині виходу малого тазу

3*

Доношена вагітність. Маса тіла вагітної 62 кг. Поздовжнє положення плода, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Обхват живота 100 см. Висота дна матки 35 см. Яка орієнтовна вага плода?

A 3 кг 500 г

B 4 кг

C 2 кг 500 г

D 3 кг

E 4 кг 500 г

* 3 кг 500

4*

Перша вагітність. Остання менструація 29 травня, перше рухання плода 20 жовтня. При першому звертанні в жіночу консультацію 24 липня була виявлена вагітність 7 тижнів. Передбачається, що пологи можуть настати:

A 5 березня

B 17 квітня

C 15 березня

D 29 березня

E 17 лютого

* 5 березня

5*

Пологи в строк. Другий період триває 1 годину головка плода врізується.

Серцебиття плода ритмічне, глухе, 150/хв.

Промежина висока. Що треба робити?

- A** Перінеотомію.
- B** Кесарів розтин.
- C** Плродоруйнівну операцію.
- D** Введення утротоніків.
- E** Очікувальна тактика.

*Перінеотомію.

6*

Вагітна 24 років, перша вагітність, I пологи. Почалася регулярна пологова діяльність. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття 4 см, плідний міхур цілий, голівка плода притиснута до **входу в малий таз**. Стрілоподібний шов у **поперечному** розмірі, тім'ячко трикутної форми в центрі **тазу**, звернено вліво. Який момент біомеханізму пологів?

- A** I момент біомеханізму пологів
- B** II момент біомеханізму пологів
- C** III момент біомеханізму пологів
- D** IV момент біомеханізму пологів
- E** V момент біомеханізму пологів

* І момент біомеханізму пологів

7*

При зовнішньому акушерському дослідженні
родиллі з доношеною вагітністю
діагностовано позовжне положення плоду,
головне передлежання. При вагінальному
дослідженні: шийка матки згладжена,
відкриття 8 см, **сагітальний** шов у лівому
косому розмірі, велике тим'ячко **праворуч**
біля лона. Встановити діагноз?

A 1 позиція, задній вид, передньоголовне передлежання.

B 1 позиція, задній вид, потиличне передлежання.

C 2 позиція, передній вид, потиличне передлежання.

D 1 позиція, задній вид, лобне передлежання.

E 1 позиція, задній вид, лицеве передлежання.

* 1 позиція, задній вид, передньоголовне передлежання.

8*

Роділля С., пологи перші, термінові.

Перейми через 2-3 хв. по 45-50 с.

Серцебиття плоду ясне, ритмічне, 144

уд./хв., передлежача голівка притиснута до

входу в малий таз. Вагінально: шийка матки

згладжена, відкриття 8 см., плідний міхур

відсутній. Який період пологів?

A Перший.

B Другий.

C Прелімінарний.

D Завершальний.

E Третій.

* Перший.

9*

Роділля 38 років, пологи перші термінові.

При поступленні в род зал: обвід живота 110 см, висота дна матки – 40 см.

Прорізується голівка плоду. Шкіра вульварного кільця бліда, мало податлива.
Ваш попередній діагноз?

- A** Загроза розриву промежини.
- B** Загроза розриву матки.
- C** Загроза розриву симфізу.
- D** Слабкість потуг.
- E** Надміру активна родова діяльність.

* Загроза розриву промежини

10*

У першородячої Н., 28 р. Пологи розпочались в 38 тижнів вагітності. Загальна тривалість пологів 7 год. 20 хв. Народила живу доношену дівчинку вагою 3400 г., довжиною 52 см, з оцінкою за шкалою Апгар 8-9 балів. Загальна крововтрата в пологах склала 250 мл. Які пологи відбулися у пацієнтки?

A Фізіологічні пологи

B Стрімкі пологи

C Швидкі пологи

D Затяжні пологи

E Передчасні пологи

* Фізіологічні пологи

11*

У роділлі 25 років, другі термінові пологи.
Перейми по 20-25 сек через 5-6 хвилин.
Положення плода поздовжнє, передлежить
голівка притиснута до входу в малий таз.
Який період пологів?

A Перший період

B Другий період

C Третій

D Прелімінарний

E Післяпологовий

*Перший період

12*

У першородячої жінки через 10 хв після народження дитини відмічається **опущення затискача на пуповині** на 10 см. від промежини. Який діагноз?

- A** Відшарування плаценти від стінки матки
- B** Неповне відшарування плаценти
- C** Защемлення плаценти
- D** Прирощення плаценти
- E** Часткове щільне прикріплення плаценти

*Відшарування плаценти від стінки матки

13*

У першородячої 20 років народився живий хлопчик масою 3200,0, довжиною 50 см. Пуповина пересічена після припинення пульсації судин. Через 10 хв. лікарем при натисканні ребром долоні над лоном відмічене **втягування пуповини** в піхву. Яку ознаку використав лікар для визначення відокремлення плаценти?

A Чукалова-Кюстнера

B Альфельда

C Шредера

D Довженка

E Роговіна

*Чукалова-Кюстнера

14*

При вимірах тазу у вагітної зростом 160 см і масою 58 кг встановлені такі розміри тазу: 26-29-31-20. Якому тазу відповідають вказані розміри?

- A** Розміри тазу нормальні
- B** Перший ступінь звуження
- C** Другий ступінь звуження
- D** Третій ступінь звуження
- E** Четвертий ступінь звуження

*Розміри тазу нормальні

15*

При внутрішньому дослідженні роділлі встановлено: шийка матки згладжена, розкриття вічка 5 см, голівка плода притиснена **до входу** в малий таз. Стрілоподібний шов **в правому косому розмірі, мале тім'ячко зліва ближче до крижів**. Вкажіть позицію та вид позиції плода.

- A** Друга позиція, задній вид
- B** Перша позиція, передній вид
- C** Перша позиція, задній вид
- D** Друга позиція, передній вид
- E** Високе пряме стояння стрілоподібного шва

*Друга позиція, задній вид

16*

Роділля 23 років. При внутрішньому акушерському дослідженні розкриття шийки матки повне. Плідний міхур відсутній. Передлежить голівка, в площині виходу з малого тазу. **Стріловидний шов в прямому розмірі виходу з тазу, мале тімечко ближче до лона.** Яким розміром голівки народиться плід при даному варіанті передлежання?

- A** Малим косим
- B** Прямим
- C** Поперечним
- D** Середнім косим
- E** Великим косим

* Малим косим

17*

Породілля 25 років, друга доба післяпологового періоду. Пологи перші, термінові, пройшли без ускладнень. Який має бути характер лохій?

A Кров'яні

B Кров'яно-серозні

C Слизові

D Гнійні

E Серозні

* Кров'яні