

Задачі для підготовки до складання іспиту

КРОК 3

Тема: Перинатальна охорона
плода*

Примітка:

** - тестові завдання, що підготовлені співробітниками кафедри (тут і надалі)*

1*

Вагітна К., 29 років, перебуває на обліку в жіночій консультації лікарні I рівня надання допомоги з діагнозом: Вагітність I, 35-36 тижнів, головне передлежання, ревматична хвороба, неактивна фаза, мітральний стеноз 2 ст., недостатність кровообігу IIA ст., ризик II. На якому рівні надання перинатальної допомоги доцільно провести розродження?

- A. Залишити на пологи в лікарні I рівня надання допомоги.
- B. Направити на пологи в перинатальний центр II рівня надання допомоги.
- C. Направити в пологове відділення лікарні інтенсивного лікування.
- D. Направити на пологи в перинатальний центр III рівня надання допомоги.
- E. Направити на пологи в Київ, у Всеукраїнський центр материнства та дитинства НАМН України.

Правильна відповідь:

- Направити на пологи в перинатальний центр III рівня надання допомоги.

2*

В жіночу консультацію лікарні I рівня надання допомоги звернулася соматично здорова першовагітна в терміні **34⁺² тижні** зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота. Вагінальне дослідження: **шийка матки вкорочена до 1,5 см, цервікальний канал пропускає палець**, плідний міхур цілий, передлежить голівка плода. В який пологовий стаціонар необхідно направити жінку?

- A. У пологове відділення перинатального центра II рівня надання допомоги.
- B. У пологове відділення перинатального центра III рівня.
- C. У Всеукраїнський центр материнства та дитинства НАМН України.
- D. В пологове відділення міської лікарні інтенсивного лікування.
- E. У пологове відділення лікарні I рівня надання допомоги.

Правильна відповідь:

- У пологове відділення перинатального центра II рівня надання допомоги.

3*

Дитина народилася від третіх фізіологічних пологів на 38 тижні вагітності масою 3700 г, зростом 52 см. За якими показниками проводять оцінювання по шкалі Апгар у цієї дитини?

- A. Серцебиття, дихання, колір шкіри, м'язевий тонус, рефлекс.
- B. Дихання, колір шкіри, наявність крику, вага, рефлекс.
- C. Вага, зріст, серцебиття, дихання, рефлекс.
- D. Серцебиття, дихання, колір шкіри, м'язовий тонус, вага.
- E. Вага, серцебиття, наявність крику, колір шкіри, м'язовий тонус.

Правильна відповідь:

- Серцебиття, дихання, колір шкіри, м'язевий тонус, рефлекс.

4*

Після народження дитина викладена на живіт матері, через 5 хвилин проведена оцінка стану дитина за шкалою Апгар: **серцебиття 140 в 1 хв., крик голосний, незначний ціаноз шкіри, рухи активні, рефлексивиражені.** На скільки балів можна оцінити стан дитини?

A. 6 балів.

B. 7 балів.

C. 8 балів.

D. 9 балів.

E. 10 балів.

Правильна відповідь:

- 9 балів.

5*

Породілля, яка перенесла кесарський розтин в 38 тижнів вагітності у зв'язку з ножним передлежанням плода, просить рекомендувати **оптимальний режим грудного вигодування**. Що ви їй порекомендуєте?

- A. Вигодування за потребою дитини.
- B. Вигодування 3 рази в день.
- C. Вигодування 4 рази в день.
- D. Вигодування 6 разів в день.
- E. Вигодування 7 разів в день.

Правильна відповідь:

- Вигодування за потребою дитини.

6*

Дитина народилася від 2-х фізіологічних пологів на 39 тижні вагітності **масою 3300 г**, зростом 50 см, з оцінкою за шкалою Апгар 8-9 балів. На третю добу при огляді активна, голосно кричить, добре смокче груди, у матері виділяється достатня кількість молозива. При зважуванні дитини її вага становить **3140 грамів**. Як розцінити зменшення ваги дитини?

- A. Неправильне зважування при народженні.
- B. Неправильне зважування на третю добу.
- C. Фізіологічна втрата ваги.
- D. Патологічна втрата ваги.
- E. Інтоксикація внаслідок запального процесу

Правильна відповідь:

- Фізіологічна втрата ваги.

7*

У новонародженої дівчинки на 4 добу спостерігається набухання молочних залоз із виділенням секрету, набухання вульви, кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Яка найбільш вірогідна причина даного стану?

- A. Припинення переходу естрогенів від матері до дитини.
- B. Прийом матір'ю гормонів під час вагітності.
- C. Підвищення рівня тиреотропного гормону у новонародженої.
- D. Гранульозоклітинна пухлина.
- E. Тестикулярна фемінізація.

Правильна відповідь:

- Припинення переходу естрогенів від матері до дитини.

8*

У новонародженого на 2 добу після народження на волосистій частині голови, складках тулуба і кінцівок з'явилися пухирці з прозорим та гнійним вмістом. Через 2 доби на місці пухирів утворилися дрібні ерозії, які покрилися шкірочками. Яке захворювання виникло у новонародженого?

- A. Пітниця.
- B. Попрілості.
- C. Піодермія.
- D. Пухирчатка.
- E. Алергічний висип.

Правильна відповідь:

- Піодермія

9*

За якими **ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИМИ** ознаками оцінюють стан новонародженої дитини відразу **після закінчення початкової допомоги?**

- A. Наявності й адекватності самотійного дихання і ЧСС.
- B. Наявності активних рухів і ЧСС.
- C. Наявності активних рухів і голосного крику.
- D. Наявності й адекватності самотійного дихання і активних рухів.
- E. Наявності ЧСС, активних рухів і голосного крику.

Правильна відповідь:

- Наявності й адекватності самостійного дихання і ЧСС.

10*

У жіночу консультацію звернулась вагітна 18 років в терміні **10-11 тижнів** вагітності. З анамнезу відомо, що **місяць тому жінка приймала тетрациклін** з приводу гострої ангіни. Який вплив лікарського засобу на плід є найбільш вірогідним у даної жінки?

- A. Вроджені вади розвитку плода.
- B. Гемолітична хвороба новонародженого.
- C. Вроджена пневмонія.
- D. Хвороба гіалінових мембран.
- E. Хромосомні аномалії плоду.

Правильна відповідь:

- Вроджені вади розвитку плода.