

Задачі для підготовки до складання іспиту

КРОК 3

Тема:

Передчасний розрив плодових
оболонок*

Примітка:

** - тестові завдання, що підготовлені співробітниками кафедри (тут і надалі)*

1*

До акушерського стаціонару звернулась першовагітна в 39 тижнів вагітності зі скаргами на водянисті виділення з піхви, які помітила 3 години тому. Соматично здорова. Вагітність перебігала без ускладнень. Стан задовільний. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Серцебиття плода 134-142 в 1 хв. Що із запропонованого треба провести для встановлення діагнозу?

- A. Огляд шийки матки в дзеркалах із вагінальним дослідженням
- B. Вагінальне дослідження
- C. Огляд шийки матки в дзеркалах без вагінального дослідження
- D. Не проводити внутрішнього акушерського дослідження
- E. Посів з цервікального каналу

Правильна відповідь:

- Огляд шийки матки в дзеркалах без вагінального дослідження

2*

До акушерського стаціонару звернулась першовагітна в 39 тижнів вагітності зі скаргами на водянисті виділення з піхви, які помітила 3 години тому, переймоподібний біль внизу живота. Соматично здорова. Вагітність перебігала без ускладнень. Стан задовільний. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Серцебиття плода 134-142 в 1 хв. Що із запропонованого треба провести для встановлення діагнозу?

- A. Огляд шийки матки в дзеркалах із вагінальним дослідженням
- B. Вагінальне дослідження
- C. Огляд шийки матки в дзеркалах без вагінального дослідження
- D. Не проводити внутрішнього акушерського дослідження
- E. Посів з цервікального каналу

Правильна відповідь:

- Огляд шийки матки в дзеркалах із вагінальним дослідженням

3*

До акушерського стаціонару звернулася першовагітна в 39 тижнів вагітності зі скаргами на водянисті виділення з піхви, які помітила 3 години тому. Соматично здорова. Вагітність перебігала без ускладнень. Стан задовільний. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Серцебиття плода 134-142 в 1 хв. При огляді шийки матки в дзеркалах - шийка матки сформована, підтікають прозорі води. Оберіть тактику ведення пацієнтки.

- A. Розпочати родозбудження внутрішньовенним введенням розчину окситоцина
- B. Розпочати родозбудження введенням простагландину
- C. Обрати вичікувальну тактику протягом 24 годин з наступним родозбудженням окситоцином
- D. Обрати вичікувальну тактику протягом 12 годин з наступним родозбудженням окситоцином
- E. Виконати кесарів розтин

Правильна відповідь:

- Обрати вичікувальну тактику протягом 24 годин з наступним родозбудженням ОКСИТОЦИНОМ

4*

До акушерського стаціонару звернулась першовагітна в 39 тижнів вагітності зі скаргами на водянисті виділення з піхви, які помітила 2 години тому. Соматично здорова. Вагітність перебігала без ускладнень. Стан задовільний. Положення плода поперечне. Серцебиття плода 134-142 в 1 хв. При огляді шийки матки в дзеркалах - шийка матки сформована, підтікають прозорі води. Оберіть тактику ведення пацієнтки.

- A. Розпочати родозбудження внутрішньовенним введенням розчину окситоцина
- B. Розпочати родозбудження введенням простагландину
- C. Обрати вичикувальну тактику протягом 24 годин з наступним родозбудженням окситоцином
- D. Обрати вичикувальну тактику протягом 12 годин з наступним родозбудженням окситоцином
- E. Виконати кесарів розтин

Правильна відповідь:

- Виконати кесарів розтин

5*

До акушерського стаціонару звернулась першовагітна в 38 тижнів вагітності зі скаргами на підтікання навколоплідних вод, яке помітила 5 години тому, переймоподібні болі внизу живота протягом 3 годин. Стан задовільний. Головне передлежання. Серцебиття плода 134-142 в 1 хв. Шийка матки згладжена, відкриття до 2 см, підтікають прозорі води. Оберіть тактику ведення пацієнтки.

- A. Розпочати родопосилення внутрішньовенним введенням розчину окситоцина
- B. Пологи вести згідно наказу МОЗ України №170 від 26.01.22 р. «Фізіологічні пологи»
- C. Запропонувати епідуральну анестезію
- D. Пологи вести згідно наказу МОЗ України №1533 від 25.08.23 «Про затвердження Стандарту медичної допомоги «Передчасний розрив плідних оболонок»
- E. Виконати кесарів розтин

Правильна відповідь:

- Пологи вести згідно наказу МОЗ України №170 від 26.01.22 р. «Фізіологічні пологи»

6*

До акушерського стаціонару звернулась вагітна в 30 тижнів вагітності зі скаргами на підтікання навколоплідних вод, яку помітила годину тому. В анамнезі 2 передчасних пологів. Стан задовільний. Матка в збудлива. Головне передлежання. Серцебиття плода 134-142 в 1 хв. При огляді шийки матки в дзеркалах – шийка зачинена, підтікають прозорі води. Оберіть тактику ведення пацієнтки.

- A. Розпочати родозбудження внутрішньовенним введенням розчину окситоцина
- B. Призначити гестагени, антибактеріальну терапію, внутрішньовенне крапельне введення розчину сульфату магнію, профілактику СДР плода
- C. Призначити профілактику СДР плода
- D. Призначити внутрішньовенне крапельне введення розчину сульфату магнію
- E. Виконати кесарів розтин

Правильна відповідь:

- Призначити гестагени, ампіцилін, внутрішньовенне крапельне введення розчину сульфату магнія, профілактику СДР плода

7*

До акушерського стаціонару звернулась першовагітна в **39 тижнів вагітності** зі скаргами на **водянисті виділення** з піхви, які помітила 2 години тому. Соматично здорова. Стан задовільний. Матка в **нормотонусі**, **голівка рухома** над входом в малий таз. Серцебиття плода 134-142 в 1 хв. При огляді шийки матки в дзеркалах - шийка матки сформована, підтікають прозорі води, в цервікальному каналі **петля пуповини**. Оберіть тактику ведення пацієнтки.

- A. Розпочати родозбудження внутрішньовенним введенням розчину окситоцина
- B. Розпочати родозбудження введенням простагландину
- C. Обрати вичикувальну тактику протягом 24 годин з наступним родозбудженням окситоцином
- D. Обрати вичикувальну тактику протягом 12 годин з наступним родозбудженням окситоцином
- E. Виконати кесарів розтин

Правильна відповідь:

- Виконати кесарів розтин

8*

До акушерського стаціонару звернулась вагітна в 32 тижні вагітності зі скаргами на підтікання навколоплідних вод, протягом доби, занадто активні рухи плода. Стан задовільний. Матка в збудлива. Головне передлежання. Серцебиття плода 184-192 в 1 хв. При огляді шийки матки в дзеркалах – шийка зачинена, підтікають меконіальні навколоплодні води. Оберіть тактику ведення пацієнтки.

- A. Розпочати родозбудження внутрішньовенним введенням розчину окситоцина
- B. Призначити ампіцилін, внутрішньовенне крапельне введення розчину сульфату магнія, профілактику СДР плода
- C. Призначити профілактику СДР плода
- D. Призначити внутрішньовенне крапельне введення розчину сульфату магнія з метою нейропротекції
- E. Виконати кесарів розтин

Правильна відповідь:

- Виконати кесарів розтин

9*

Вагітна, що протягом тижня знаходилась у відділенні патології вагітних з приводу ТДРПО в терміні вагітності 28 тижнів, поскаржилась на підвищення температури тіла до 38 °С, активні рухи плода. Стан задовільний. Матка збудлива. Головне передлежання. Серцебиття плода 188-190 в 1 хв. В загальному аналізі крові лейкоцитоз $16 \times 10^9/\text{л}$, СРБ 96 мг/л. При огляді шийки матки в дзеркалах – шийка зачинена, підтікають світлі навколоплідні води. Оберіть тактику ведення пацієнтки.

- A. Розпочати дезінтоксикаційну терапію зі зміною антибактеріального препарату
- B. Призначити повторну профілактику СДР плода, крапельне введення розчину сульфату магнія,
- C. Розпочати родозбудження розчином окситоцину
- D. Призначити внутрішньовенне крапельне введення розчину сульфату магнія з метою нейропротекції
- E. Виконати кесарів розтин

Правильна відповідь:

- Виконати кесарів розтин

10*

До лікаря жіночої консультації звернулася пацієнтка, яка страждає на хронічну артеріальну гіпертензію, в **терміні вагітності 21 тиждень** із скаргами на головний біль та появу **водянистих виділень зі статевих шляхів**. Стан задовільний. АТ 160/100 мм рт.ст., Рс 96 за 1 хв., констатуються екстрасистоли. Матка в нормотонусі. При огляді шийки матки в дзеркалах – шийка зачинена, підтікають світлі навколоплідні води. Якою повинна бути тактика лікаря.

- A. Направити пацієнтку в гінекологічний стаціонар
- B. Призначити антибактеріальну терапію амбулаторно.
- C. Направити пацієнтку в акушерський стаціонар
- D. Направити пацієнтку в кардіологічний стаціонар
- E. Направити пацієнтку до сімейного лікаря

Правильна відповідь:

- Направити пацієнтку в гінекологічний стаціонар

11*

До акушерського стаціонару доставлена вагітна в 32 тижні вагітності зі скаргами на підтікання навколоплідних вод, протягом доби. Стан задовільний. Матка в нормотонусі. Головне передлежання. Серцебиття плода 124-130 в 1 хв. При огляді шийки матки в дзеркалах – шийка зачинена, підтікають прозорі навколоплідні води. Які бактеріологічні дослідження треба провести?

- A. Бактеріологічні дослідження не показані
- B. Бактеріологічне дослідження матеріалу з піхви та прямої кишки на СГВ (*Streptococcus agalactiae*), цервікального каналу
- C. Бактеріологічне дослідження сечі
- D. Бактеріологічне дослідження обстеження на гонорею та хламідіоз
- E. Бактеріологічне дослідження прямої кишки

Правильна відповідь:

- Бактеріологічне дослідження матеріалу з піхви та прямої кишки на СГВ (*Streptococcus agalactiae*), цервікального каналу

12*

До акушерського стаціонару доставлена першовагітна в 36 тижнів вагітності зі скаргами на водянисті виділення з піхви, які помітила 1 годину тому. Стан задовільний. Матка в нормотонусі, голівка над входом в малий таз. Серцебиття плода 134-142 в 1 хв. При огляді шийки матки в дзеркалах - шийка матки сформована, підтікають прозорі води. Обрана очікувальна тактика. Через 2 години з'вились болі внизу живота та рясні кров'яні виділення. Серцебиття плода 180-192 в 1 хв. Оберіть тактику ведення пацієнтки.

- A. Призначити транексамову кислоту, провести плазмотрансфузію
- B. Провести гемо-плазмотрансфузію
- C. Розпочати родозбудження розчином окситоцину
- D. Призначити метаболічну, гемостатичну та кисневу терапію
- E. Виконати кесарів розтин

Правильна відповідь:

- Виконати кесарів розтин

13*

До акушерського стаціонару доставлена вагітна в 36 тижнів вагітності зі скаргами на підтікання навколоплідних вод, яке помітила 3 години тому. Стан задовільний. Матка в нормотонусі. Головне передлежання. Серцебиття плода 134-142 в 1 хв. При огляді в дзеркалах шийка матки сформована, довжиною до 2 см, підтікають прозорі води. Оберіть тактику ведення пацієнтки.

- A. Розпочати профілактику СДР плода
- B. Пологи вести згідно наказу МОЗ України №170 від 26.01.22 р. «Фізіологічні пологи»
- C. Запропонувати очікувальну тактику протягом 24 годин з подальшим родозбудженням окситоцином
- D. Пологи вести згідно наказу МОЗ України №1533 від 25.08.23 «Про затвердження Стандарту медичної допомоги «Передчасний розрив плідних оболонок»
- E. Призначити гестагени та внутрішньовенну інфузію сульфату магнію з метою нейропротекції у плода

Правильна відповідь:

- Запропонувати очікувальну тактику протягом 24 годин з подальшим родозбудженням окситоцином