

Задачі для підготовки до складання іспиту КРОК 3

Тема:

Фізіологія вагітності та пологів*

Примітка:

** - тестові завдання, що підготовлені співробітниками кафедри (тут і надалі)*

1*

До пологового будинку надійшла роділля з регулярною пологовою діяльністю, у якої вилились навколоплідні води. Голівка плода щільно притиснута до входу в малий таз. Зправа пальпуються мілкі частини плода, зліва та спереду – спинка. Серцебиття плода чітке, ритмічне - 136/хв. При піхвовому дослідженні встановлено: відкриття шийки матки 7 см, стрілоподібний шов в правому косому розмірі, мале тім'ячко спереду та нижче великого, розташоване ліворуч. Визначити положення, позицію, вид та передлежання плода.

А – косо положення плода, І позиція передній вид;

В – поздовжнє положення плода, І позиція передній вид, головне передлежання;

С – поздовжнє положення плода, ІІ позиція передній вид, головне передлежання;

Д – поздовжнє положення плода, І позиція задній вид, головне передлежання;

Е – поздовжнє положення плода, І позиція передній вид, тазове передлежання.

*поздовжнє положення плода,
І позиція передній вид, головне
передлежання;

2*

При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: форма матки витягнена у поперечному напрямку, термін вагітності 40 тижнів, в лівій стороні матки пальпується голівка, в правій – тазовий кінець плода, над входом в малий таз передлегла частина відсутня. Серцебиття плода найвиразніше прослуховується на рівні пупка. Яке положення та позиція плода?

А – косо положення плода, I позиція передній вид;

В – поперечне положення плода, II позиція передній вид;

С – поперечне положення плода, I позиція;

Д – поперечне положення плода, II позиція;

Е – косо положення плода, II позиція передній вид.

поперечне положення плода,
І позиція;

3*

У жінки при відвідуванні лікаря 18 травня 2024 року тест на вагітність позитивний. У неї регулярний 28-денний цикл, остання менструація була з 1 по 5 квітня 2024 року. Яка передбачувана дата пологів?

A – 17.01.2025 p.;

B – 22.01.2025 p.;

C – 01.01.2025 p.;

D – 08.02.2025 p.;

E – 08.01.2025 p.

08.01.2025

4*

У пацієнтки 22-х років скарги на затримку менструації протягом 2-х місяців. Змінилися смакові відчуття. Пологи – 0, абортів – 0. При огляді в дзеркалах: слизова оболонка піхви та шийки матки ціанотичні. Піхвове дослідження – матка кульоподібної форми, збільшена як на 7-8 тижнів вагітності, м'якуватої консистенції. Придатки без особливостей. Перешийок матки розм'якшений. Склепіння піхви вільні. Який діагноз найбільш вірогідний?

- А – лейоміома матки невеликих розмірів;
- В – ектопічна вагітність в терміні 7-8 тижнів;
- С – маткова вагітність в терміні 10-11 тижнів;
- Д – вагітність в терміні 7-8 тижнів;
- Е – порушення менструального циклу.

вагітність в терміні 7-8 тижнів;

5*

30-річна схвильована жінка звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на відсутність апетиту, нудоту, ранкову блювоту. Відмічає затримку менструації на 20 днів. При загальному обстеженні патології не виявлено. Гінекологічний статус: відмічається ціаноз піхви та шийки матки, розм'якшення перешийку матки, матка кульоподібної форми, дещо збільшена, розм'якшена, додатки матки не змінені, склепіння піхви вільні. Яке додаткове обстеження може запропонувати жінці сімейний лікар?

А – ультразвукове обстеження органів малого тазу;

В – проведення тесту на вагітність;

С – обстеження на гельмінтози;

Д – фіброгастроскопію;

Е – визначення кислотності шлункового вмісту.

проведення тесту на вагітність;

6*

Вагітна 22 років спостерігається в жіночий консультації з приводу вагітності з 10 тижнів. Соматично здорова. Вагітність I, 28 тижнів, положення плоду поздовжнє, головне передлежання. В 25-26 тижнів лікувалася у відділенні патології вагітних з приводу загрози передчасних пологів. З якого терміну вагітності та на скільки днів жінці буде надана допологова відпустка?

А – в 30 тижнів на 126 днів;

В – в 32 тижні на 126 днів;

С – в 32 тижні на 56 днів;

Д – в 28 тижнів на 140 днів;

Е – в 32 тижні на 112 днів.

в 30 тижнів на 126 днів;

7*

Породілля 40 років виписана з післяпологового відділення після кесарського розтину. Післяопераційний період перебігав без ускладнень. Чи показане надання жінці додаткової післяпологової відпустки та на який термін?

A – показане на 24 дні;

B – не показане;

C – показане на 14 днів;

D – показане на 30 днів;

E – показане на 10 днів.

показане на 14 днів;

8*

Жінка 25 років з I вагітністю в терміні 39 тижнів доставлена в пологове відділення зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота протягом 4 годин. Об'єктивно: стан задовільний, перейми по 35-40 секунд через 5-6 хвилин. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода 134-138 за 1 хвилину. Піхвове дослідження: шийка матки згладжена, відкриття до 3 см. В якому періоді пологів знаходиться жінка?

А – в латентній фазі I періоду своєчасних пологів;

В – в активній фазі I періоду своєчасних пологів;

С – в ранній фазі II періоду своєчасних пологів;

Д – в активній фазі I періоду передчасних пологів;

Е – в пізній фазі II періоду запізнілих пологів.

в латентній фазі I періоду
своєчасних пологів;

9*

Породілля, яка 7 днів тому після нормальних пологів виписана з післяпологового відділення в задовільному стані, звернулась до сімейного лікаря у зв'язку з підвищенням температури тіла до 38,3°C, появою тягнучого болю внизу живота, гнійних виділень зі статевих органів.
Тактика лікаря?

- A – призначити жінці жарознижуючі препарати;
- B – призначити жінці антибактеріальні препарати;
- C – провести зціджування молочних залоз;
- D – терміново направити жінку в гінекологічне відділення;
- E – призначити вдома інфузійну терапію.

терміново направити жінку в
гінекологічне відділення;

10*

Породілля вдома на 14 добу після нормальних пологів помітила, що її дитина млява, погано смокче груди, у неї підвищується температура тіла до 38,8°C. Яку пораду ви надасте жінці?

- А – забезпечити достатнє годування та допоювання;
- В – дати дитині жарознижуючі препарати;
- С –загорнути дитину у вологі пелюшки;
- Д – розгорнути дитину;
- Е – негайно звернутися до педіатра.

негайно звернутися до педіатра.