

Задачі для підготовки до складання іспиту КРОК 3

Тема:

Самовільний викидень*

Примітка:

** - тестові завдання, що підготовлені співробітниками кафедри (тут і надалі)*

1*

Першовагітна у терміні 20 тижнів скаржиться на болі внизу живота, мажучі кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Матка в підвищеному тонусі. Рухи плода відчуває. Під час бімануального дослідження: матка збільшена відповідно терміну вагітності, шийка матки вкорочена до 0,5 см, зовнішнє вічко відкрите на 2 см. Виділення кров'янисті, мажучі. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A. Загрозливий викідень
- B. Аборт, що розпочався
- C. Аборт в ході
- D. Неповний аборт
- E. Завмерла вагітність

- Загрозливий викидень

2*

Першовагітна у терміні **9 тижнів** скаржиться на **переймоподібні болі** внизу живота, **рясні кров'янисті виділення** зі статевих шляхів. Матка в підвищеному тонусі. Під час бімануального дослідження: матка збільшена відповідно **до 6-7 тижнів вагітності**, шийка матки вкорочена **до 1 см**, цервікальний канал **вільно пропускає палець, пролабують частини плідного яйця**. Виділення кров'янисті, рясні, **яскраві**. Тактика ведення пацієнтки?

- A. Вишкрібання стінок порожнини матки.
- B. Накладання шва на шийку матки.
- C. Призначення спазмолітиків.
- D. Призначення гормонотерапії.
- E. Призначення седативної терапії.

- Вишкрібання стінок порожнини матки.

3*

У вагітної 12 тижнів без видимої причини з'явився ниючий біль внизу живота та мажучі кров'янисті виділення темного кольору. Під час піхвового дослідження: шийка матки сформована, зовнішнє вічко закрите. Тіло матки збільшено відповідно вказаного терміну вагітності. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:

- A. Аборт в ходу
- B. Аборт, що розпочався
- C. Загрозливий аборт
- D. Неповний аборт
- E. Викидень, що не відбувся

- Загрозливий аборт