

Задачі для підготовки до складання іспиту

КРОК 3

Тема:

Аномальні вагінальні виділення*

Примітка:

** - тестові завдання, що підготовлені співробітниками кафедри (тут і надалі)*

1*

На прийом до лікаря звернулась жінка 43 років зі скаргами на рясні виділення зі статевих шляхів, що мають специфічний рибний запах. Підтверджений бактеріальний вагіноз. Якого додаткового дослідження потребує жінка?

- A. Бактеріологічне дослідження з цервікального каналу
- B. Бактеріологічне дослідження сечі
- C. Обстеження на хламідіоз, гонококову інфекцію, трихомоніаз
- D. Обстеження на вульвовагінальний кандидоз
- E. Обстеження на інші види дисбіозів

Правильна відповідь:

- Обстеження на хламідіоз, гонококову інфекцію, трихомоніаз

2*

Жінка 34 років звернулася до лікаря зі скаргами на **сироподібні комкуваті** виділення зі статевих шляхів. З анамнезу відомо, що такі скарги має не вперше, за останній рік відмічає 2 епізоди подібних скарг, за допомогою не зверталась, лікування не отримувала. При проведенні культурального мікологічного дослідження виявлено ***Candida*** albicans. Який діагноз є найбільш доцільним?

- A. Гострий вульвовагінальний кандидоз
- B. Рецидивуючий вульвовагінальний кандидоз
- C. Хронічний вульвовагінальний кандидоз
- D. Бактеріальний вагіноз
- E. Рецидивуючий бактеріальний вагіноз

Правильна відповідь:

- Гострий вульвовагінальний кандидоз

3*

Пацієнтка 29 років має виділення зі статевих шляхів жовтуватого кольору, рясні. Мала статевий контакт з чоловіком, хворим на **тріхомоніаз**. Який метод діагностики цього захворювання в неї треба призначити?

- A. Мікроскопія фарбованого за Грамом мазка вагінальних виділень
- B. Дослідження на основі методу ампліфікації нуклеїнових кислот
- C. Оцінка за критеріями Ньюджента
- D. Оцінка за критеріями Хей-Айсона
- E. Культуральне мікологічне дослідження

Правильна відповідь:

- Дослідження на основі методу ампліфікації нуклеїнових кислот

4*

Жінка 32 років скаржиться на виражене подразнення, свербіж, дизурія, диспареунія, дискомфорт внизу живота, виділення з неприємним запахом.

При огляді піхва гіперемована, шика матки має «**полуничний**» вигляд. Яке обстеження слід призначити для уточнення діагнозу?

- A. Мікроскопія фарбованого за Грамом мазка вагінальних виділень
- B. Дослідження на основі методу ампліфікації нуклеїнових кислот
- C. Оцінка за критеріями Ньюджента
- D. Оцінка за критеріями Хей-Айсона
- E. Культуральне мікологічне дослідження

Правильна відповідь:

- Дослідження на основі методу ампліфікації нуклеїнових кислот

5*

Пацієнтка 24 років скаржиться на рясні виділення з піхви. При огляді слизова піхви рожевого кольору, без пошкоджень. При аналізі мазка, пофарбованого за Грамом виявлена **ступінь 3 за критеріями Hay-Ison**. Які препарати будуть пріорітетними для лікування?

- A. Метронідазол або кліндаміцин
- B. Флюконазол або кліндаміцин
- C. Фентиконазол або клотримазол
- D. Метронідазол або клотримазол
- E. Кліндаміцин або клотримазол

Правильна відповідь:

- Метронідазол або кліндаміцин

6*

При обстеженні жінки шляхом мікроскопії вагінальних виділень (фарбування за Грамом) виявлена підвищена кількість лейкоцитів, поверхневі епітеліоцити, відсутність лактобацил. рН вагінальних виділень 6,3. За критеріями Hay-Ison – ступінь 4. Який діагноз?

- A. Бактеріальний вагіноз
- B. Трихомоніаз
- C. Аеробний вагініт
- D. Вульвовагінальний кандидоз
- E. Гонорейна інфекція

Правильна відповідь

- Аеробний вагініт

7*

Жінка скаржиться на **зуд, печію і біль** у піхві при **відсутності рясних виділень** . При огляді піхви в зеркалах мають місце виражена гіперемія, набряк, тріщини. На стінках - **сироподібні комкуваті** маси в невеликій кількості. Який метод діагностики НЕ доцільно призначати у даному випадку?

- A. рН-метрія вагінальних виділень
- B. Посів на *Candida albicans*
- C. Посів на неальбікантні форми *Candida*
- D. Посів на умовно- патогенну аеробну флору
- E. Мазок вагінальних виділень,
пофарбований за Грамом

Правильна відповідь

- Посів на умовно- патогенну аеробну флору

8*

Жінці, яка скаржиться зуд, печію і біль у піхві та появу сироподібних виділень, обстежена шляхом культуральне мікологічне дослідження. Виявлена Candida *glabrata* у 10^5 КУО. Яке лікування слід призначити жінці?

- Клотримазол 500 мг одноразово інтравагінально;
- Клотримазол 200 мг інтравагінально на ніч протягом 7 днів поспіль
- Ністатин 100 000 Од на день інтравагінально 14 днів
- Ністатин 500 000 Од 4 рази на день перорально 10 днів
- Фентиконазол інтравагінально у вигляді одноразової дози 600 мг

Правильна відповідь

- Ністатин 100 000 Од на день
інтравагінально 14 днів

9*

До лікаря звернулася жінка з явищами вульвовагінального кандидозу. Має цукровий діабет з дитинства. За останній рік мала 4 епізоди вульвовагінального кандидозу протягом року, з виявленням *Candida albicans* у кількості 10^5 - 10^6 КУО. Яке лікування треба призначити жінці ?

- Перорально флуконазол 150 мг кожні 72 год 3 дози, потім 150 мг щотижня протягом 6 міс
- Перорально флуконазол 150 мг кожні 72 год 3 дози, потім 150 мг щомісяця протягом 6 міс
- Перорально флуконазол 150 мг одноразово, потім 150 мг щотижня протягом 6 міс
- Перорально флуконазол 150 мг одноразово 3 дози, потім 150 мг щомісяця протягом 6 міс
- Перорально флуконазол 150 мг кожні 72 год щотижня протягом 6 міс

Правильна відповідь

- Перорально флуконазол 150 мг кожні 72 год 3 дози, потім 150 мг щотижня протягом 6 міс

10*

Пацієнтка 24 років мала скарги на рясні виділення з піхви з **неприємним запахом** . При аналізі мазка, пофарбованого за Грамом виявлена **ступінь 3 за критеріями Hay-Ison**. Після проведеного лікування кліндамицином протягом 7 днів запах і виділення зникли. Що потрібно зробити з перерахованого?

- A. Обстеження і лікування статевого партнера
- B. Мікроскопія фарбованого за Грамом мазка вагінальних виділень
- C. Оцінка за критеріями Ньюджента
- D. Оцінка за критеріями Хей-Айсона
- E. Нічого з перерахованого

Правильна відповідь

- Ністатин 100 000 Од на день
інтравагінально 14 днів